

序号	日期	CEA	升降	用药	用药时间	备注	主要靶点	主要靶点	
1	2012.08-2014.05	未测		盲吃印易	21个月	直至耐药			
2	2014.05-06			吉西+卡铂	2个月				
3	2014.07-09			培美单药	3个月				
4	2014.10-2015.01			印易	4个月				
5	2015.01.17-02.11			培美单药	1个月				
6	2015.02.12	247.5		200mg4002联特	1个月	找到与癌共舞			
7	2015.03.15	124.2	-49.80%	200mg4002联特	2d				
8	2015.03.17			200mg4002联易					
9	2015.05.01	78.2	-37.00%	200mg4002联易	33d				
10	2015.05.15			200mg4002联特	14d				
11	2015.06.10	67.32	-13.91%	75mg2992	24d	因腹泻无法耐受，改为			
12	2015.07.04	54.49		60mg2992/d	24d	换中医院测得，无可比性， 吃药期间体感正常			
13	2015.08.05	72.82	33.64%	250mg凡德/d	31d	咳嗽增多			
14	2015.08.25	65.14	-15.30%	阿西5mg*2/d	16d	血压升高，乏力,中间停药4	V		
15	2015.09.24	46.79	-28.17%	特+200mg4002/d	30d		E	T790	
16	2015.10.27	77.03	64.89%	易+200mg4002/d	27d		E	T790	
17	2015.11.10	99.95	29.70%	特+200mg4002/d	14d		E	T790	
18	2015.12.04	84.78	-15.30%	特+40mg184/d	24d		E	V	CMET
19	2015.12.30	95.86	12.80%	6天60mg29, 17天70mg,	26d	腹泻，中间停药3天	E	T790	
20	2016.01.17	93.66	-2.30%	4天70mg2992，6天250mg 凡德联40mg的184，再7 天的270mg凡德联40mg的 184	18d	1.15-17号发现早晨咳嗽加重	EV	T790	CMET
21	2016.02.13	105.2	12.30%	7天的270mg凡德联半量 特，7天的阿西5*2，10 天的300mg4002联半量特	27d	住院期间因腹泻、乏力停药3 天	EV	T790	
22	2016.03.06	73.05	-30.56%	6天300mg4002联半量 特，16天特联2粒多吉美	22d	期间有三天轻微腹泻，身体 明显好转，饭量增加	EV	T790	
23	2016.04.04	64.59	-11.58%	5天特联2粒多吉美；6天 300mg4002联半量特；15 天特联150mg克	28d	每天150mg克，3.17号至4.4 号期间，因为呕吐停克药3天 (3.18号和4.1号)，单特维 持	EV	T790	CMET
24	2016.05.03	87.54	35.70%	4.5-15号，300mg凡德； 4.16-4.22号：270mg凡 德联40mg184，4.23-27 号300mg凡德/d，4.28- 05.2号，再联40mg184	30d	吃药期间，因晚上睡觉时咳 嗽加重，在5.03号查C反应蛋 白，超标，参考值0-4，实 测8.79，证明有感染，口服 头孢克肟和阿莫西林			CMET
25	2016.5.15	111.57	27.50%	5mg*2阿西	13d	期间吃人参保肺丸，C反应蛋 白仍超标，达12.78。阿西副 作用明显，乏力，无食欲， 体感差	V		
26	2016.6.15	92.16	-17.39%	5.16-27特联半量多吉 美，28号开始6天 300mg4002联半量特，其 余4天单特，6.7-14 号，特联半量多吉美	31d	继续人参保肺丸，咳嗽减 少，乏力，无食欲。中间因 呕吐现象停药三天。检查血 常规和肝功，基本正常，但 谷草谷丙比值偏高，经咨 询，谷草谷丙都正常情况 下，比值没有多大意义，为 保险起见，上水飞。期间体	E+V	T790	
27	2016.7.19	88.08	-4.43%	6.15号特联184，于6.17 号开始60mg9291，6天后 开始80mg9291	34d	184两天后腹泻，6.15开始每 天10毫克左右蛋白粉.本次C 反应蛋白仍超标，达10.3， 比上次降低，本月体感明显 改善，体重没再下降	E	T790	
28	2016.9.08	75.91	-13.82%	6.25-27号停药三天，28 号-8.6号每天 60mg9291，8.7号开始 90mg9291，9.1号开始 90mg和60mg各一天	50d	7.25号-8.6号之间因腹泻腹 痛住院，经检查有阑尾炎， 期间停药三天，改为每天 60mg，8.7号开始每天90mg， 9.1号开始，一天90，一天60 来回交替。C反应基本正常， 血红蛋白由住院期间的7.8升	E	T790	
29	2016.10.16	101.29	33.43%	90mg和60mg的9291交替 各一天	38d	C反应正常，血红蛋白由9.2 升至10.2。通过艾灸及补血 红蛋白，体感好，体重稍增 加。但CEA增幅大，莫非90mg 和60mg交替不行？还是92耐 药？单用92已四个月，准备 改为2992+VC+4002半量（隔	E	T790	